

INSTRUCTIVO 3 – v1 -CUIDADO DE ESPECIES IDENTIFICADAS PRIORITARIAS POR SNAP

En predios del grupo se han identificado por parte del Prof. Gabriel Rocha 2 especies consideradas de prioritarias para el SNAP, no amenazadas según UICN

1 - Volatinero (*Volatinia jacarina*).



macho



hembra



juvenil macho

Orden Passeriformes

Familia Thraupidae

Nombre científico *Volatinia jacarina*

Reproducción de noviembre a enero

Tipo de reproducción – monogamia

Dimorfismo sexual adultos – Marcado, macho negro con reflejos azulados. El plumaje reproductivo azul-negro del macho sólo se observa en la temporada húmeda de verano; las aves jóvenes y en muda presentan manchas azul-negro y café. Las hembras son todas café con el pecho estriado.

Pareja permanente

Ritual de apareamiento - El macho vuela desde una rama, hacia arriba, mostrando las partes internas blancas de las alas. Simultáneamente canta. Por último desciende a la misma rama

Posición del nido - en el suelo, en pastizales

Forma del nido - semiesfera

Materiales del nido - Fibras vegetales, forrado internamente con fibras vegetales muy finas y crines

Cantidad de huevos por nido – 3

Características de los huevos - Verdes claro con pintas castañas principalmente en el polo mayor

Pequeña ave muy común en campos con arbustos y malezas, y otros pastizales abiertos en tierras bajas tropicales y laderas de cerro. Nota su tamaño muy pequeño y pico cónico y puntiagudo. En su canto de cortejo, el macho se eleva desde una espiga en el pasto o una cerca, emitiendo un sonido de zumbido corto, que repite varias veces.

2 - Zorro gris

El zorro gris (*Lycalopex gymnocercus*) es un cánido sudamericano cuya distribución abarca la Pampa, el norte de Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Es un omnívoro oportunista, de porte mediano, hábitos nocturnos y solitarios.



Aspecto del zorro gris

Su cuerpo suele medir entre 70 y 100 cm de longitud total en la edad adulta, contando con su cola que puede llegar a tener unos 30 cm de largo.

Peso - entre 2,5 y 4,5 kg, siendo las hembras ligeramente más pequeñas y delgadas que los machos.

Color de pelaje, que suele ser mayormente grisáceo en su dorso y lomo. Pero se observan algunas zonas amarillentas en su cabeza y en sus patas, manchas negras en su barbilla y en la punta de su cola, y unas bandas también de color negro en sus muslos y en el dorso de su cola. Además, su vientre suele exhibir un color blancuzco, y cerca de sus orejas pueden aparecer unos reflejos rojizos.

Otras características físicas destacadas de los zorros grises: hocico puntiagudo, las orejas grandes y triangulares con las puntas ligeramente redondeadas, y la cola larga que contribuye para su equilibrio y lo ayuda a impulsarse cuando desea escalar los árboles de su hábitat natural.

Comportamiento del zorro gris

Sin lugar a duda, el rasgo más destacado y curioso sobre el comportamiento del zorro gris es su asombrosa habilidad de trepar por los árboles y otras superficies. Otro característico hábito de caza de los zorros grises es que suelen sacar ventaja de su buen desempeño en el agua para ahogar a sus presas, impidiendo que se escapen. De hecho, estos cánidos son muy buenos nadadores e incluso pueden usar el agua para refrescarse durante los días más cálidos.

Por hablar en caza, el zorro gris es un animal omnívoro que mantiene una dieta muy variada en su hábitat. Además de cazar sus propias presas, que son mayormente mamíferos y aves de pequeño y mediano porte, estos cánidos también pueden aprovecharse de la carroña dejada por otros depredadores, y suele consumir frutos para complementar su nutrición.

Caso se encuentre en una época o región de escaso alimento, el zorro gris también puede comportarse como un carnívoro oportunista, capturando huevos de otros animales, y cazando también reptiles y artrópodos. Y cuando se adaptan a vivir cerca de ciudades y poblados, pueden llegar a atacar las aves de corral o aprovecharse de los residuos de la alimentación humana.

Reproducción del zorro gris

La época de reproducción de los zorros grises suele ocurrir entre los meses de agosto y octubre, empezando a fines del invierno en el hemisferio Sur. Pero el periodo de apareamiento puede variar significativamente según el hábitat en que viven los individuos.

Estos cánidos son monógamos y fieles a su pareja, encontrándose siempre con la misma en cada época reproductiva, hasta que uno de los dos muera. Así mismo, suelen pasar mucho tiempo sin aparearse hasta que se sientan preparados para elegir una nueva pareja.

Al igual que todos los cánidos, los zorros grises son animales vivíparos, es decir, la fecundación y desarrollo de las crías se da en el interior del vientre materno. Las hembras experimentan un periodo de gestación de 52 a 60 días, tras el que suelen dar la luz a camadas de 4 a 7 cachorros, que serán amamantados hasta completar sus 4 o 5 meses de vida.

Este documento podrá ser entregado a la comunidad y a los contratistas o personas que realicen tareas en predios del grupo.

De ser posible se hará seguimiento de estos, así como la posibilidad de identificación en todos los establecimientos integrantes del grupo.

Se exigirá que los individuos de estas especies no sean cazados ni perseguidos